

摘藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要

子部

御纂醫宗金鑑卷三十一



欽定四庫全書薈要

御纂醫宗金鑑卷三十一

刪補名醫方論卷六目錄



桂枝湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龍湯

葛根湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

越婢湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

桂枝加附子湯

芍藥甘草附子湯

桂枝甘草湯

桂枝加芍藥加大黃湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

小建中湯

炙甘草湯

桂枝人參湯

葛根黃芩黃連湯

白虎湯

白虎加人參湯

豬苓湯

五苓散

茵陳五苓散

桂枝去芍加苓朮湯

十棗湯

欽定四庫全書醫要卷一萬四百八十五

子部

御纂醫宗金鑑卷三十一

刪補名醫方論卷六

桂枝湯

治風寒在表脈浮弱自汗出頭痛發熱惡風惡寒鼻
鳴乾嘔等證及雜證自汗盜汗虛損虛癰亦可用若
脈浮緊汗不出者酒客病風寒而汗出者禁用

桂枝 三兩

芍藥 三兩

生薑 三兩

甘草 二兩
炙

大棗 十二枚

右五味以水七升煮取三升服一升覆令微汗不可令如水流漓病必不除若服一升汗出病瘥不必盡劑服已更歡稀粥一盞以助藥力

註凡風寒在表脉浮弱自汗出者皆屬表虛宜桂枝湯主之名曰桂枝湯者君以桂枝也桂枝辛溫辛能散邪溫從陽而扶衛為藥酸寒酸能斂汗寒走

陰而益營桂枝君芍藥是於發散中寓斂汗之意
芍藥臣桂枝是於固表中有微汗之道焉生薑之
辛佐桂枝以解肌表大棗之甘佐芍藥以和營裏
甘草甘平有安內攘外之能用以調和中氣即以
調和表裏且以調和諸藥矣以桂芍之相須薑棗
之相得藉甘草之調和陽表陰裏氣衛血營並行
而不悖是剛柔相濟以為和也而精義在服後須
臾飲熱稀粥以助藥力蓋穀氣內充不但易為釀

汗更使已入之邪不能少留將來之邪不得復入也又妙在溫服令一時許熱熱微似有汗是授人以微汗之法不可令如水流漓病必不除禁人以此不可過汗之意也此方為仲景羣方之冠乃解肌發汗調和營衛之第一方也凡中風傷寒脈浮弱汗自出而表不解者皆得而主之其他但見一二證即是不必悉具故麻葛青龍發汗諸劑咸用之也若汗不出麻黃證也脈浮緊者麻黃脈也固不

可與桂枝湯然初起無汗當用麻黃發汗如汗解
後復煩脈浮數者與下後脈仍浮氣上衝者及下
後下利止而身痛不休者皆用此以解外何也蓋
此時表雖不解腠理已疏邪不在皮毛而在肌肉
且經汗下津液已傷故脈證雖同麻黃而主治當
屬桂枝矣粗工妄謂桂枝湯專治中風不治傷寒
使人疑而不用又謂專發肌表不治他病不知此
湯倍芍藥生薑加人參名桂枝新加湯用以治營

表虛寒肢體疼痛倍芍藥加飴糖名小建中湯用
以治裏虛心悸腹中急痛再加黃耆名黃耆建中
湯用以治虛損虛熱自汗盜汗因知仲景之方可
通治百病也

麻黃湯

治太陽風寒在表頭項強痛發熱身疼腰痛骨節痛惡風寒無汗胸滿而喘其脈浮緊或浮數者用此發汗雖有是證若脈浮而弱汗自出或尺中脈微與遲者俱不可用風寒濕成痺肺經壅塞昏亂不語冷風哮吼最宜

麻黃

三兩
去節

桂枝

二兩

甘草

一兩
炙

杏仁

六十枚
去皮尖

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合溫覆取微汗不須歠粥一服汗出停後服汗出多者溫粉撲之

註

凡風寒在表脈浮緊數無汗者皆表實也宜麻黃湯主之名曰麻黃湯者君以麻黃也麻黃性溫味辛而苦其用在迅升桂枝性溫味辛而甘其能在固表證屬有餘故主以麻黃必勝之算也監以桂枝制節之妙也杏仁之苦溫佐麻黃逐邪而降逆

甘草之甘平佐桂枝和內而拒外飲入於胃行氣
於元府輸精於皮毛斯毛氤合精溱溱汗出在表
之邪必盡去而不留痛止喘平寒熱頓解不須歎
粥而藉汗於穀也其不用薑棗者以生薑之性橫
散於肌礪麻黃之迅升大棗之性泥滯於膈礪杏
仁之速降此欲急於直達稍緩則不迅橫散則不
升矣然則為純陽之劑過於發散如單刀直入之
將用之若當一戰成功不當則不戢而召禍故可

一而不可再如汗後不解便當以桂枝代之此方
為仲景開表逐邪發汗第一峻藥也庸工不知其
制在溫覆取汗若不溫覆取汗則不峻也世謂麻
黃專能發表不治他病不知此湯合桂枝湯名麻
桂各半湯用以和太陽留連未盡之寒熱去杏仁
加石膏合桂枝湯名桂枝二越婢一湯用以解太
陽熱多寒少之寒熱若陽盛於內而無汗者又有
麻黃杏仁甘草石膏湯以散太陰肺之邪若陰盛

於內而無汗者又有麻黃附子細辛甘草湯以溫散少陰腎家之寒金匱要略以此方去桂枝千金方以此方桂枝易桂皆名還魂湯用以治邪在太陰卒中暴厥口噤氣絕下咽奏效而皆不溫覆取汗是知麻黃湯之峻與不峻在溫覆與不溫覆此仲景用方之心法豈常人所能得而窺耶

大青龍湯

治太陽風寒兩傷營衛同病傷寒之脈而見中風之證中風之脈而見傷寒之證二證俱不出汗而煩躁者用此兩解發汗雖有是證若脈微弱自汗出者不可服之服必亡陽

麻黃

六兩
去節

桂枝

二兩

杏仁

四十箇
去皮尖

甘草

二兩
炙

生薑

三兩
切

大棗

十二
枚擘

石膏

如雞子大
碎綿裹

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升取微汗汗出多者溫粉撲之一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也

註何以知風寒兩傷營衛同病以傷寒之脈而見中風之證中風之脈而見傷寒之證也名大青龍湯者取龍興雲雨之義也治風不外乎桂枝治寒不

外乎麻黃合桂枝麻黃二湯以成劑故為兼風寒
中傷者主之也二證俱無汗故減芍藥不欲其收
也二證俱煩躁故加石膏以解其熱也設無煩躁
則又當從事於麻黃桂枝各半湯也仲景於表劑
中加大寒辛甘之品則知麻黃證之發熱熱全在
表大青龍證之煩躁兼肌裏矣初病太陽即用石
膏者以其辛能解肌熱寒能清胃火甘能生津液
是預保陽明存津液之先着也粗工疑而畏之當

用不用必致熱結陽明斑黃狂冒紛然變出矣觀此則可知石膏乃中風傷寒之要藥得麻桂而有青龍之名得知草而有白虎之號也服後取微汗汗出多者溫粉撲之一服得汗停其後服蓋戒人即當汗之證亦不可過汗也所以仲景桂枝湯中不用麻黃者是欲其不大發汗也麻黃湯中用桂枝者恐其過汗無制也若不慎守其法汗多亡陽變生諸逆表遂空虛而不任風陰盛格陽而更煩

躁不得眠也

小青龍湯

治傷寒表不解心下水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者及雜病膚脹水腫證用此發汗而利水

麻黃

三兩
去節

芍藥

三兩

五味子

半升

甘草

三兩
炙

乾薑

二兩

半夏

半升
洗

桂枝

三兩

細辛

三兩

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升

若渴者去半夏加栝蒌根三兩

若噎者去麻黃加附子一枚

炮

若小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓四兩

若喘者去麻黃加杏仁半升

去皮尖

若微利者去麻黃加薤花如雞子

熬令赤色

按加薤花如雞子熬令赤色此必傳寫之譌蓋本草

莢花即芫花類也用之攻水其力甚峻五分可令人下行數十次豈有治停飲之微利而用雞子大之莢花者乎當改加茯苓四兩

註

太陽停飲有二一中風表虛有汗五苓散證也一傷寒表實無汗小青龍湯證也表實無汗故合麻桂二方以解外去大棗者以其性泥也去杏仁者以其無喘也有喘者加之去生薑者以有乾薑也若嘔者仍用佐乾薑細辛極溫極散使寒與水俱

從汗而解佐半夏逐痰飲以清不盡之飲佐五味收肺氣以斂耗傷之氣若渴者去半夏加花粉避燥以生津也若微利與噎小便不利少腹滿俱去麻黃遠表以就裏也加附子以去噎散寒則噎可止加茯苓以利水則微利少腹滿可除矣此方與越婢湯同治水飲溢於表而為膚脹水腫宜發汗外解者無不隨手而消越婢治有熱者故方中君以石膏以散陽水也小青龍治有寒者故方中佐

以薑桂以消陰水也

欽定四庫全書

欽定四庫全書
卷三十一

葛根湯

治太陽陽明兩經合病頭項強痛背亦牽強脈浮無汗惡風者及表不解下利而嘔者並宜服此發汗

葛根

四兩

麻黃

二兩
去節

桂枝

二兩

芍藥

二兩

甘草

二兩
炙

生薑

二兩
切

大棗

十二
枚擘

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去沫內

諸藥煮取三升溫服一升覆取微似汗不須歠粥
餘如桂枝法將息及禁忌

註

是方也即桂枝湯加麻黃葛根麻黃佐桂枝發太
陽營衛之汗葛根君桂枝解陽明肌表之邪不曰
桂枝湯加麻黃葛根而以葛根命名者其意重在
陽明以嘔利屬陽明多也二陽表急非溫服覆而
取汗其表未易解也或嘔或利裏已失和雖歠粥
而胃亦不能輸精於皮毛故不須歠粥也柯琴曰

此證身不疼腰不疼骨節不疼不惡寒是骨不受

寒矣頭項強痛下連於背牽動不寧是筋傷於風
矣不喘不煩躁不乾嘔是裏不病無汗惡風病只
在表若表病而兼下利則是表實裏虛矣比麻黃
青龍二證較輕然項強連背拘強更甚於項強無
汗不失為表但脈浮不緊故不從乎麻黃而於桂
枝方加麻黃倍葛根以去實小變麻桂之法也蓋
葛根為陽明主藥凡太陽有陽明者則佐入太陽

藥中凡少陽有陽明者則佐入少陽藥中無不可也李杲定為陽明經藥張潔古云未入陽明者不可便服豈二人未讀仲景書乎要知葛根桂枝俱是解肌和裏之藥故有汗無汗下利不下利俱可用與麻黃之專於發表者不同也

金匱治太陽病無汗小便反少氣上衝胃口噤不得語欲作剛瘕

集註喻昌曰傷寒項背几几無汗惡風者用葛根湯此

證亦用之者以其邪在太陽陽明兩經之界兩經之熱併於胸中必傷肺金清肅之氣故水道不行小便少津液不布而無汗陽明之筋內結胃口外行胸中過人迎環口熱併陽明斯筋脈牽引口噤不得語然剛瘕無汗必從汗解沉濕邪內鬱必以汗出如故而止故用此湯合解兩經之濕熱與風寒之表法無害其同也

桂枝麻黃各半湯

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少其人不嘔清便欲自可一日二三度發脈微緩者為欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也面色反有熱色者未欲解也以其不能得小汗出身必癢宜桂枝麻黃各半湯

桂枝

一兩
六銖

芍藥

一兩

麻黃

一兩
去節

生薑

一兩

甘草

炙一兩

大棗

擘四枚

杏仁

二十四箇
去皮尖

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合

註

太陽病得之八九日有如瘧狀之寒熱熱多寒少者其人不嘔小便清白此裏和不受邪雖為欲自愈然必審其如瘧狀寒熱一日二三度輕輕而發診其脈微而且緩則知邪衰正復表裏將和始為

欲愈也若衄微不緩正未復也更惡寒者邪未衰也雖不能自愈但已為前之汗吐下虛其表裏故不可更發汗更吐更下也衄微惡寒表裏俱虛面色當白今色反赤是猶有表邪怫鬱不能得小汗出宣發陽氣故面赤身癢未欲解也宜桂枝麻黃各半湯小小汗之以和營衛自可愈也

桂枝二麻黃一湯

服桂枝湯大汗出脈洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧日再發者汗出必解宜桂枝二麻黃一湯

桂枝

一兩十
七銖

芍藥

一兩
六銖

麻黃

十六銖
去節

甘草

一兩
二銖

杏仁

十六箇
去皮尖

生薑

一兩
六銖

大棗

五枚
擘

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸

藥煮取二升去滓溫服一升日再服

註

服桂枝湯大汗出衄洪大不解若煩渴者則表邪已入陽明白虎湯證也今衄雖洪大而不煩渴則為表邪仍在太陽故與桂枝湯如前法也若衄不洪大壯熱亦減惟寒熱如瘧日再發者雖屬輕邪然終為微寒所持非汗出必不解也宜桂枝二麻黃一湯小發營衛之汗不用麻黃桂枝各半湯者蓋因已大汗出不欲其發營衛汗欲其和營衛汗也

桂枝二越婢一湯

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也不
可更汗宜桂枝二越婢一湯

桂枝

一兩
六銖

芍藥

一兩

甘草

一兩三
銖炙

石膏

二十
四銖

麻黃

十六
銖

大棗

五枚
擘

生薑

一兩六
銖切

右七味以水五升煮麻黃一二沸去上沫內諸藥

煮取二升去滓溫服一升日再服本方當裁為越婢湯桂枝湯各飲一升今合為一方桂枝二越婢一湯

註

桂枝二越婢一湯即大青龍以杏仁易芍藥也名雖越婢輔桂枝實則大青龍之變制也去杏仁惡其從陽而辛散用芍藥以其走陰而酸收以此易彼裁而用之則主治不同也以桂枝二主之則不發汗可知越婢一者乃麻黃石膏二物不過取其

辛涼之性佐桂枝二中和表而清熱則是寓微汗於不發之中亦可識也非若大青龍以石膏佐麻黃而為發汗驅熱之重劑也桂枝二麻黃一湯治若形如瘧日再發者汗出必解而無熱多寒少故不用石膏之涼也桂枝麻黃各半湯治如瘧狀熱多寒少而不用石膏更倍麻黃者以其面有怫鬱熱色身有皮膚作癢是知熱不向裏而向表令得小汗以順其勢故亦不用石膏之涼裏也桂枝二

越婢一湯治發熱惡寒熱多寒少而用石膏者以
其表邪寒少肌裏熱多故用石膏之涼佐麻桂以
和營衛非發營衛也今人一見麻桂不問輕重亦
不問溫覆不溫覆取汗不取汗總不敢用皆因未
究仲景之旨麻桂祇是營衛之藥若重劑溫覆取
汗則為發營衛之藥輕劑不溫覆取汗則為和營
衛之藥也

越婢湯

治風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大熱者又治裏水一身面目黃腫其脈沉小便不利故令病水假令小便自利此亡津液故令渴也越婢加朮湯主之

麻黃

六兩

石膏

半觔

生薑

三兩切

大棗

十五枚擘

甘草

一兩

惡風加附子一枚炮

右五味以水六升煮麻黃去沫內諸藥煮取三升分三服

集註

喻昌曰越婢湯者示微發表於不發之方也大率

取其通調營衛麻黃石膏二物一甘熱一甘寒合而用之脾偏於陰則和以甘熱胃偏於陽則和以甘寒乃至風熱之陽水寒之陰凡不和於中土者悉得用之何也中土不和則水穀不化其精悍之

氣以實營衛營衛虛則或寒或熱之氣皆得壅塞其隧道而不通於表裏所以在表之風水用之而在裏之水兼渴而小便自利者咸必用之無非欲其不害中土耳不害中土自足消患於方萌矣

趙良曰五藏各一其陰陽獨脾胃居中而兩屬之故土不獨成四氣土亦從四維而後成不惟火生而已於是四方有水寒之陰即應於脾風熱之陽即應於胃飲食五味之寒熱凡入於脾胃者亦然一

有相干則脾氣不和胃氣不清而水穀不化其精
微以行營衛以實陰陽也甘者土之本味所以脾
氣不和和以甘熱胃氣不清清以甘寒麻黃之甘
熱走手足太陰經連於皮膚行氣於三陰以祛陰
寒之邪石膏之甘寒走手足陽明經達於肌肉行
氣於三陽以祛風熱之邪既用其味甘以入土用
其寒熱以和陰陽用其性善走以發越脾氣更以
甘草和中緩急二藥相協而成功大棗之甘補脾

中之血生薑之辛益胃中之氣惡風者陽虛故加
附子以益陽風水者則加朮以散皮膚間風水氣
發穀精以宣營衛與麻黃石膏為使引其入土也
越婢之名不亦宜乎

按喻昌所論明析趙良之說能細剖其理開悟後學
故兩錄之

麻黃杏仁甘草石膏湯

治溫熱內發表裏俱熱頭痛身疼不惡寒反惡熱無汗而喘大煩大渴脈陰陽俱浮者用此發汗而清火若脈浮弱沉緊沉細惡寒自汗出而不渴者禁用

麻黃

四兩
去節

杏仁

五十枚
去皮尖

甘草

二兩
炙

石膏

半觔碎
綿裹

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升去滓溫服一升

集註

柯琴曰石膏為清火之重劑青龍白虎皆賴以建

功然用之不當適足以召禍故青龍以無汗煩躁
得薑桂以宣衛外之陽也白虎以有汗煩渴須粳
米以存胃中之液也此但熱無寒故不用薑桂喘
不在胃而在肺故不須粳米其意重在存陰不必
慮其亡陽也故於麻黃湯去桂枝之監制取麻黃
之專開杏仁之降甘草之和倍石膏之大寒除內
外之實熱斯溱溱汗出而內外之煩熱與喘悉除矣

麻黃附子細辛湯

治少陰病始得之反發熱脈沉二三日無裏證者

麻黃

一兩

附子

一枚
炮

細辛

二兩

熱微者以甘草易細辛微發汗

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去沫內藥煮
取三升去滓溫服一升日三服

集註柯琴曰少陰主裏應無表證病發於陰應有表寒

今少陰始受寒邪而反發熱是有少陰之裏而兼有太陽之表也太陽之表脈應不沉今脈沉者是有太陽之證而見少陰之脈也故身雖熱而脈則沉也所以太陽病而脈反沉使用四逆以急救其裏此少陰病而表反熱便於表劑中加附子以預固其裏夫發熱無汗太陽之表不得不開沉為在裏少陰之樞又不得不固設用麻黃開腠理細辛散浮熱而無附子以固元陽則少陰之津液越出

太陽之微陽外亡去生便遠惟附子與麻黃並用
則寒邪雖散而陽不亡此裏病及表衄沉而當發
汗者與病在表衄浮而發汗者逕庭也若表微熱
則受寒亦輕故以甘草易細辛而微發其汗甘以
緩之與辛以散之者又少間矣

桂枝加附子湯

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者此方主之

桂枝湯加附子一枚

炮去皮
破八片

煎服法同不須歠粥

集註

柯琴曰發汗太過陽無所止息而汗出不止矣汗

多亡陽元府不閉風乘虛入故復惡風津液外泄不能潤下故小便難四肢者諸陽之本陽氣者柔

則養筋開闔不得風寒從之故筋急而屈伸不利
也是方以附子加入桂枝湯中大補表陽也表陽
密則漏汗自止惡風自罷矣汗止津回則小便自
利四肢自柔矣汗漏不止與大汗出同而從化變
病則異服桂枝麻黃後大汗出而大煩渴是陽陷
於裏急當救陰故用白虎加入參湯服桂枝麻黃
湯大汗出遂漏不止是陽亡於外急當救陽故用
桂枝加附子湯要知發汗之劑用桂枝不當則陽

陷於裏者多用麻黃不當則陽亡於外者多因桂
枝湯有芍藥而無麻黃故雖汗大出而元府尚能
自閉多不致亡陽於外耳

芍藥甘草附子湯

發汗病解反惡寒者虛故也此方主之

芍藥

三兩

甘草

二兩
炙

附子

一枚炮去
皮破八片

右三味以水五升煮取一升五合去滓分溫服

集註柯琴曰發汗病解而反惡寒比未汗時更甚其陽

虛可知矣夫太陽少陰為表裏太陽之病本由少
陰之虛不能藏精而為陽之守也今惡寒反見於

發汗病解後是寒邪已從汗解太陽陽虛不能衛外而為陰之使也則陽亡之兆已見於此若仍以桂枝湯攻表非以扶陽反以亡陽也故以芍藥收少陰之精氣甘草緩陰邪之上行附子補坎宮之少火但使腎中元陽得位在表之虛陽惡寒自解耳

桂枝甘草湯

治發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者

桂枝

四兩

甘草

二兩
炙

右二味水三升煮取一升頓服

集註柯琴曰汗出多則心液虛中氣餒故悸叉手自冒

則外有所衛得按則內有所依如此不堪之狀望之而知其虛矣桂枝本營分藥得麻黃則令營氣外發而為汗從辛也得芍藥則收斂營氣而止汗

從酸也得甘草則補中氣而養血從甘也故此方以桂枝為君獨任甘草為佐以補陽氣生心液甘溫相得斯氣血和而悸自平不須附子者以汗雖多而未至於陽亡不須芍藥者以汗已止而嫌其陰斂也

桂枝加芍藥加大黃湯

本太陽病醫反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之大實痛者桂枝加大黃湯主之

桂枝加芍藥湯方

於桂枝湯方內更加芍藥三兩隨前共六兩餘依

桂枝湯法

桂枝加大黃湯方

即桂枝加芍藥湯方內更加大黃一兩

集註柯琴曰腹滿為太陰陽明俱有之證然位同而職

異太陰主出太陰病則腐穢之出不利故滿而時
痛陽明主內陽明病則腐穢燥而不行故大實而
痛大實痛是陽明病不是太陰病仲景因表證未
解陽邪已陷入於太陰故倍芍藥以益脾調中而
除腹滿時痛此用陰和陽法也若表邪未解而陽
邪陷入於陽明則加大黃以潤胃通結而除其大
實痛此雙解表裏法也凡妄下必傷胃氣胃氣虛

則陽邪襲陰故轉屬太陰胃液涸則兩陽相搏故
轉屬陽明屬太陰則腹滿時痛而不實陰道虛也
屬陽明則腹滿大實而痛陽道實也滿而時痛是
下利之兆大實而痛是燥屎之徵故倍加芍藥小
變建中之劑少加大黃微示調胃之方

小建中湯

治傷寒表未解或心悸而煩或腹中急痛而脈陽濇陰弦者

桂枝 三兩

芍藥 六兩

生薑 三兩切

甘草 二兩

膠飴 一觔

大棗 十二枚擘

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上火消解日三服嘔家不可用建中湯以甜故也

註

是方也即桂枝湯倍芍藥加膠飴名曰小建中謂

小小建立中氣以中雖已虛表尚未和不敢大補也故以桂枝湯仍和營衛倍芍藥加膠飴調建中州而不歡稀粥溫服令汗蓋其意重在中虛而不傷寒之表也中虛建立營衛自和津液可生汗出乃解煩悸可除矣傷寒浮得衄瀉營衛不足也沉得衄弦木入土中也營衛不足則表虛木入土中則裏急表虛裏急故亦以此湯主治也嘔家不

可用謂凡病嘔者不可用恐甜助嘔也

欽定四庫全書

傳習錄
卷三十一

炙甘草湯

治傷寒脈結代心動悸者 又治肺痿咳吐多心中

溫溫液液者

甘草

炙四兩

生薑

切三兩

桂枝

三兩

麥門冬

半升

麻子仁

半升

大棗

十二枚擘

人參

一兩

阿膠

二兩

生地黃

一觔

右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓內膠烱消盡服一升日三服

集註

柯琴曰仲景於脈弱陰弱者用芍藥以益陰陽虛

者用桂枝以通陽甚則加人參以生脈未有用地黃麥冬者豈以傷寒之法義重扶陽乎抑陰無驟補之法歟此以心虛脈結代用生地黃為君麥冬為臣峻補真陰開後學滋陰之路也地黃麥冬味雖甘而氣則寒非發陳蕃莠之品必得人參桂枝

以通陽脈生薑大棗以和衛營阿膠補血酸棗安神甘草之緩不使速下清酒之猛捷於上行內外調和悸可寧而脈可復矣酒七升水八升祇取三升者久煎之則氣不峻此虛家用酒之法且知地黃麥冬得酒最良此證當用酸棗仁肺痿用麻子仁可也如無真阿膠以龜板膠代之

欽定四庫全書

詩經傳義
卷三十一

桂枝人參葛根黃芩黃連二湯合論

太陽外證未解而數下之遂協熱而利利下不止表裏不解脈微弱心下痞鞭者桂枝人參湯主之桂枝證醫反下之利遂不止其脈促喘而汗出者葛根黃連黃芩湯主之

桂枝

四兩

甘草

四兩

人參

三兩

白朮

三兩

乾薑

三兩

水九升先煮四味取五升內桂更煮三升日再服

夜一服

葛根半觔

黃連三兩

黃芩三兩

甘草二兩
炙

水八升先煮葛根減二升內諸藥煮二升分溫再服

集註

柯琴曰外熱不除是表不解下利不止是裏不解

病因則同一以微弱之脈而心下痞鞭是脈不足

而證有餘一以衄促而喘反汗自出是衄有餘而證不足表裏虛實當從衄而辨證矣弱衄見於數下後則痞鞭為虛故用理中之辛甘溫補止利消痞鞭又加桂枝以解表先煮四味後內桂枝和中之力饒而解肌之氣銳是於兩解中寓權宜法也桂枝證衄本緩誤下後而反促陽氣重可知邪束於表陽擾於內故喘而汗出利遂不止者是暴注下迫屬於熱也故君氣清質輕之葛根以解肌而

止利佐苦寒清肅之苓連以止汗而除喘又加甘草以和中先煮葛根後內諸藥解肌之力緩而清中之氣銳又與補中逐邪者殊法矣又曰上條衄證是陽虛雖協熱於外而裏則虛寒下條衄證是陽盛雖下利不止而表裏俱實同一協熱利同是表裏不解而寒熱虛實攻補不同前方理中加桂枝而冠桂枝於人參之上後方瀉心加葛根而冠葛根於苓連之首不名理中瀉心者總為表未解

故耳補中亦能解表涼中亦能散表補中亦能散
痞涼中亦能止利仲景製兩解方神化如此

欽定四庫全書

欽定四庫全書
卷三十一

白虎湯

治陽明證汗出渴欲飲水脈洪大浮滑不惡寒反惡熱

石膏

一觔碎綿裏

知母

六兩

甘草

二兩

粳米

六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

集註柯琴曰陽明邪從熱化故不惡寒而惡熱熱蒸外

越故熱汗自出熱爍胃中故渴欲飲水邪盛而實
故脈滑然猶在經故兼浮也蓋陽明屬胃外主肌
肉雖有大熱而未成實終非苦寒之味所能治也
石膏辛寒辛能解肌熱寒能勝胃火寒性沉降辛
能走外兩擅內外之能故以為君知母苦潤苦以
瀉火潤以滋燥故以為臣用甘草粳米調和於中
宮且能土中瀉火作甘稼穡寒劑得之緩其寒苦
藥得之平其苦使沉降之性皆得留連於胃也得

二味為佐庶大寒之品無傷損脾胃之慮也煮湯入胃輸脾歸肺水精四布大煩大渴可除矣白虎為西方金神取以名湯秋金得令而炎暑自解矣更加人參以補中益氣而生津協和甘草粳米之補承制石膏知母之寒瀉火而土不傷乃操萬全之術者

欽定四庫全書

欽定四庫全書
卷三十一

白虎加人參湯

治太陽中熱汗出惡寒身熱而渴者喝是也

石膏 一觔

知母 六兩

甘草 二兩

粳米 六合

人參 三兩

右五味以水如前煮服法

集註 趙良曰汗出惡寒身熱而不渴者中風也汗出惡

寒身熱而渴者中喝也其證相似獨以渴不渴為

辨然傷寒中風皆有背微惡寒與時時惡風而渴者亦以白虎人參湯治之蓋為火爍肺金肺主氣者也肺傷則衛氣虛衛虛則表不足由是汗出身熱惡寒內經曰心移熱於肺傳為膈消膈消則渴皆相火傷肺所致可知其要在救肺也石膏能治三焦火熱功多於清肺退肺中之火故用為君知母亦就肺中瀉心火滋水之源人參生津益所傷之氣而為臣粳米甘草補土以資金為佐也

豬苓湯

治陽明病脈浮發熱渴欲飲水少陰病下利六七日
欬而嘔渴心煩不得眠者

豬苓

去皮

茯苓

阿膠

滑石

澤瀉

各一兩

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內下阿
膠烱消溫服七合日三服

集註 趙羽皇曰仲景製豬苓一湯以行陽明少陰二經

水熱然其旨全在益陰不專利水蓋傷寒表虛最忌亡陽而裏熱又患亡陰亡陰者亡腎中之陰與胃家之津液也故陰虛之人不但大便不可輕動即小水亦忌下通蓋陰虛過於滲利則津液反致耗竭方中阿膠質膏養陰而滋燥滑石性滑去熱而利水佐以二苓之滲瀉既疏濁熱而不留其瘀壅亦潤真陰而不苦其枯燥是利水而不傷陰之

善劑也故太陽利水用五苓者以太陽職司寒水
故加桂以溫之是煖腎以行水也陽明少陰之用
豬苓以二經兩關津液特用阿膠滑石以潤之是
滋養無形以行有形也利水雖同寒溫迥別惟明
者知之

五苓散附茵陳五苓散

治脈浮小便不利熱微消渴者發汗已脈浮數煩渴者中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐者

茯苓

十八銖

豬苓

十八銖

白朮

十八銖

澤瀉

一兩

桂

半兩

右五味為散以白飲和服方寸七日三服多服煖

水汗出愈

註是方也乃太陽邪熱入府水氣不化膀胱表裏藥

也一治水逆水入則吐一治消渴水入則消夫膀胱者津液之府氣化則能出矣邪熱入之若水盛則水壅不化而水蓄於上膀胱之氣化不行致小便不利也若熱盛則水為熱耗而水消於上膀胱之津液告竭致小便不利也水入吐者是水盛於熱也水入消者是熱盛於水也二證皆小便不利

故均得而主之然小便利者不可用恐重傷津液
也由此可知五苓散非治水熱之專劑乃治水熱
小便不利之主方也君澤瀉之鹹寒鹹走水府寒
勝熱邪佐二苓之淡滲通調水道下輸膀胱並瀉
水熱也用白朮之燥濕健脾助土為之隄防以制
水也用桂之辛溫宣通陽氣蒸化三焦以行水也
澤瀉得二苓下降利水之功倍小便利而水不蓄
矣白朮須桂上升通陽之效捷氣騰津化渴自止

也若發熱表不解以桂易桂枝服後多服煖水令
汗出愈是此方不止治停水小便不利之裏而猶
解停水發熱之表也加人參名春澤湯其意專在
助氣化以生津加茵陳名茵陳五苓散治濕熱發
黃表裏不實小便不利者無不克也

桂枝湯去芍藥加茯苓白朮湯

治服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心
下滿微痛小便不利者桂枝去芍藥加茯苓白朮湯
主之

桂枝去芍藥加茯苓白朮湯方

於桂枝湯方內去芍藥加茯苓白朮各三兩餘依
桂枝湯法煎服小便利則愈

註
服桂枝湯已汗也或下之已下也今仍有頭項強

痛翕翕發熱無汗之表心下滿微痛小便不利停
飲之裏無汗表不解心下有水氣當用小青龍汗
之今無汗表不解有水氣心下滿微痛小便不利
而不用小青龍者以其已經汗下表裏俱虛也故
仍用桂枝湯以解表去芍藥之酸收避無汗心下
之滿加茯苓之燥滲因水停小便不利也餘依桂
枝湯法煎服謂依桂枝湯法取汗也小便利則愈
謂飲病輸水道則愈也此方即桂苓甘朮湯而有

生薑大棗其意專在解肌利水次之故用生薑大
棗佐桂枝以通津液取汗也桂苓甘朮湯不用生
薑大棗而加茯苓其意專在利水扶陽次之故倍
加茯苓君桂枝於利水中扶陽也故方後不曰依
服桂枝湯方也

十棗湯

治太陽中風表解熱熱汗出而不惡寒裏有水氣小便不利嘔逆短氣心下至脇痞滿鞭痛者此治水之急方也

大棗十枚

擘

甘遂

大戟

芫花熬各等分

右三味各別搗為散以水一升半先煮大棗肥者十枚取八合去滓內藥末強人一錢羸人服半錢

平旦溫服若下少病不除者明日再服加半錢得
快下後糜粥自養

集註

柯琴曰仲景治水之方種種不同此其最峻者也
凡水氣為患或喘或欬或悸或噎或吐或利病在
一處而止此則水邪留結於中心腹脇下痞滿鞭
痛三焦升降之氣阻隔難通此時表邪已罷非汗
散之法所宜裏飲實盛又非淡滲之品所能勝非
選逐水至峻之品以折之則中氣不支束手待斃

矣甘遂芫花大戟三味皆辛苦氣寒而稟性最毒
併舉而用之氣味相濟相須故可夾攻水邪之巢
穴決其瀆而大下之一舉而患可平也然邪之所
湊其氣必虛以毒藥攻邪必傷及脾胃使無沖和
甘緩之品為主宰則邪氣盡而大命亦隨之矣然
此藥最毒參朮所不能君甘草又與之相反故選
十棗之大而肥者以君之一以顧其脾胃一以緩
其峻毒得快利後糜粥自養一以使穀氣內充一

以使邪不復作此仲景用毒攻病之法盡美又盡善也昧者惑於甘能中滿之說而不敢用豈知承制之理乎



御纂醫宗金鑑卷三十一



總校官庶吉士

臣

張能照

校對官庶吉士

臣

翟槐

膳錄舉人

臣

羅步雲

欽定四庫全書薈要

子部

御纂醫宗金鑑卷三十二




詳校官主事臣陳本

欽定四庫全書薈要

御纂醫宗金鑑卷三十二

刪補名醫方論卷七目錄



大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

更衣丸

麻仁丸

桃仁承氣湯

抵當湯丸

梔子豉湯

梔子豉加甘草湯

梔子豉加生薑湯

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

瓜蒂散

小陷胸湯

大陷胸湯丸

三物白散

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

甘草瀉心湯

生薑瀉心湯

半夏瀉心湯

旋覆代赭石湯

麻黃連軀赤小豆湯

梔子蘂皮湯

茵陳蒿湯

欽定四庫全書薈要卷一萬四百八十六

子部

御纂醫宗金鑑卷三十二

刪補名醫方論卷七

大承氣湯

治陽明病潮熱手足濇然汗出譫語汗出多胃燥獨
語如見鬼狀喘冒不能卧腹滿痛脈滑實又目中不
了了睛不和又少陰病初得之口燥咽乾者自利清
水色純青心下痛口燥舌乾者六七日腹脹不大便

者

大黃

四兩
酒洗

厚朴

半觔

枳實

五枚
炙

芒消三合

右四味以水一斗先煮二物取五升內大黃煮取
二升去滓內芒消再上火微煮一二沸分溫再服
得下卽停後服

小承氣湯

大黃

四兩

厚朴

二兩
炙
去皮

枳實 三枚

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫三服
初服湯當大便不爾再服以利為度得便即止服
柯琴曰諸病皆因於氣穢物之不去由於氣之不

集註

順也故攻積之劑必用氣分之藥因以承氣名湯
方分大小者有二義焉厚朴倍大黃是氣藥為君
名大承氣大黃倍厚朴是氣藥為臣名小承氣味
多性猛制大其服欲令大泄下也因名曰大味寡

性緩制小其服欲微和胃氣也因名曰小且煎法更有妙義大承氣用水一斗煮枳朴取五升去滓內大黃再煮取二升內芒消何哉蓋生者氣銳而先行熟者氣純而和緩仲景欲使芒消先化燥屎大黃繼通地道而後枳朴除其痞滿若小承氣以三味同煎不分次第同一大黃而煎法不同此可見仲景微和之意也

喻昌曰金匱治瘕為病胸滿口噤卧不着席脚攣

急必斷齒可與大承氣湯乃死中求生之法也靈
樞謂熱而瘕者死腰折瘕瘕齒斷也茲所云卧不
着席即腰折之變文脚攣急即瘕瘕之變文且斷
齒加以胸滿口噤上中下三焦熱邪充斥死不旋
踵矣在傷寒證腹滿可下胸滿則不可下然投是
湯者須知所謂胸滿謂其邪尚在表故不可下此
證入裏之熱極深極重匪可比倫况陽熱深極陰
血立至消亡即小小下之尚不足以勝其陽救其

陰故取此湯以承領其一綫之陰氣陰氣不盡為
陽熱所劫因而得生者多矣可與二字甚活臨證
酌而用之初非定法也既有下之重傷其陰之大
戒復有下之急救其陰之活法學者欲為深造端
在此矣

調胃承氣湯

治表解有汗裏熱不除胃因不和而不作解者

大黃

四兩
酒洗

甘草

二兩
炙

芒消

半觔

右三味以水三升先煮二味取一升去滓內芒消
微煮令沸少少溫服之

註

三承氣湯之立名而曰大者制大其服欲急下其
邪也小者制小其服欲緩下其邪也曰調胃者則

有調和承順胃氣之義非若大小專攻下也經曰
熱淫於內治以鹹寒火淫於內治以苦寒君大黃
之苦寒臣芒消之鹹寒二味並舉攻熱瀉火之力
備矣更佐甘草之緩調停於大黃芒消之間又少
少溫服之使其力不峻則不能速下而和也

更衣丸

治津液不足腸胃乾燥大便不通

硃砂

五錢研
如飛麪

蘆薈

七錢研
細生用

滴好酒少許和丸每服一錢二分好酒下

集註

柯琴曰胃為後天之本不及固病太過亦病然太

過復有陽盛陰虛之別焉兩陽合明而胃家實仲

景製三承氣湯以下之三陽燥結而津液亡前賢

又製更衣丸以潤之古人入廁必更衣故以此命

名也硃砂以汞為體性寒重墜下達蘆薈以液為
質味苦膏潤下滋兼以大寒大苦之性味能潤燥
結從上導下而胃關開矣合以為丸兩者相須得
效最宏奏功甚捷誠匪夷所思矣

麻仁丸 又名脾約丸

治腸胃燥熱大便秘結小便數多

麻子 二升

芍藥 半觔

枳實 半觔

大黃 一觔 去皮

厚朴 一觔 去皮

杏仁 一升 去皮 煎熬碾脂

右六味為末煉蜜為丸桐子大飲服十丸日三服

漸加以利為度

集成無已曰約者約結之約又約束也經曰飲入於

胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經并行今胃強脾弱約束津液不得四布但輸膀胱小便數而大便鞭故曰脾約麻仁甘平而潤杏仁甘溫而潤經曰脾欲緩急食甘以緩之本草曰潤可去燥是以麻仁為君杏仁為臣枳實破結厚朴瀉滿故以為佐芍藥調中大黃通下故以為使

朱震亨曰既云脾約血枯火燔津竭理宜滋陰降

火津液自生何秘之有此方惟熱甚而稟實者可
用熱微而虛者愈致燥涸之苦矣

桃仁承氣湯

治血結胸中手不可近或中焦畜血寒熱胸滿漱水不欲嚥善忘昏迷如狂者此方治敗血留經通月事

桃仁

五十個
去皮尖

桂枝

三兩

大黃

四兩

芒消

二兩

甘草

二兩

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒消更上火微沸下火先食溫服五合日三服當微利

抵當湯並丸

治傷寒畜血併治癥瘕追蟲攻毒甚佳

水蛭三十個
熬

亡蟲三十個
去頭足
熬

大黃三兩

桃仁三十個
去皮尖

右四味為散以水五升煮三升去滓溫服一升不
下再服利為度

水蛭二十個
熬

亡蟲二十五個
熬去翅

桃仁二十個
去皮尖

大黃三兩

右四味杵分為四丸以水一升煮一丸取七合服
晬時當下血若不下更服

集註

柯琴曰膀胱為水府血本無所容畜者也少腹者
膀胱之室也熱結鞭滿當小便不利而反利者是
病不在膀胱內而在少腹內也可知其隨經之營
血因瘀熱而結於少腹之裏而非膀胱之裏也故
小便雖利而鞭滿急結畜血仍瘀於少腹也熱淫
於內神魂不安故發狂血瘀不行則營不運故衄

微而沉營不運則氣不宣故沉而結也營氣不周於身則身黃消穀善饑者胃火熾盛也大便秘者血之濡也色黑者畜血滲入也善忘者血不榮智不明也此皆瘀血之徵兆非至峻之劑不足以抵其巢穴而當此重任故立抵當湯蛭蟲之善飲血者而利於水蟲蟲之善吮血者而猛於陸並取水陸之善取血者以攻之同氣相求更佐桃仁之苦甘推陳致新大黃之苦寒蕩滌邪熱故名抵當

也若熱雖盛而未狂少腹滿而未鞭宜小其制為
丸以緩治之若外證已解少腹急結其人如狂是
轉屬陽明用調胃承氣加桃仁桂枝之行血者於
其中以微利之胃和則愈矣此桃仁承氣為治之
緩也

梔子豉湯

附加減諸湯

治陽明病脈浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重煩躁心中憤憤怵惕懊懣目疼鼻乾不得卧

梔子

十四枚擘

香豉

四合綿裹

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分二服溫進一服得吐止後服若少氣者加甘草二兩

若嘔者加生薑三兩

若下後心煩腹滿起卧不安者去香豉加厚朴四兩枳實四枚

若醫以丸藥下之身熱不去心中結痛去香豉加乾薑二兩

若身熱發黃者去香豉加甘草一兩黃蘗二兩

集註

柯琴曰太陽以心腹為裏陽明以心腹為表蓋陽

明之裏是胃實不特發熱惡熱目痛鼻乾汗出身

重謂之表一切虛煩虛熱咽燥口苦舌胎腹滿煩躁不得卧消渴而小便不利凡在胃之外者悉是陽明之表也仲景製汗劑是開太陽表邪之出路製吐劑是引陽明表邪之出路所以太陽之表宜汗不宜吐陽明之表當吐不當汗太陽當汗而反吐之便見自汗出不惡寒饑不能食朝食暮吐欲食冷食不欲近衣等證此太陽轉屬陽明之表法當梔子豉湯吐之陽明當吐而不吐反行汗下溫

鍼等法以致心中憤憤怵惕懊懷煩躁舌胎等證
然仍在陽明之表仍當梔子豉湯主之梔子苦能
涌泄寒能勝熱其形象心又赤色通心故主治心
中上下一切證豆形象腎又黑色入腎製而為豉
輕浮上行能使心腹之濁邪上出於口一吐而心
腹得舒表裏之煩熱悉解矣所以然者急除胃外
之熱不致胃家之實即此梔豉湯為陽明解表之
聖劑矣熱傷氣者少氣加甘草以益氣虛熱相搏

者多嘔加生薑以散邪若下後而心腹滿起卧不安是熱已入胃便不當吐故去香豉屎未燥鞭不宜復下故祇用梔子以除煩佐枳朴以泄滿此兩解心腹之妙又小承氣之輕劑也若以丸藥下之身熱不去知表未解也心中結痛知寒留於中也表熱裏寒故任梔子之苦以除熱倍乾薑之辛以逐寒而表熱自解裏寒自除然非吐不能達表故用此以探吐之此又寒熱並用為和中解表之劑

矣內外熱熾肌肉發黃必須苦甘之劑以調之藥
皮甘草色黃而潤助梔子以除內煩而解外熱形
色之病仍假形色以通之此皆用梔鼓加減以禦
陽明表證之變幻也夫梔子之性能屈曲下行不
是上涌之劑惟鼓之腐氣上蒸心肺能令人吐耳
觀瓜蒂散必用鼓汁和服是吐在鼓而不在梔也
梔子乾薑湯去鼓用薑是取其橫開梔子厚朴湯
以枳朴易鼓是取其下泄似皆不欲上越之義雖

苦亦能作涌然非探吐不能吐也病人舊微溇者
不可與則梔子之性自明矣

瓜蒂散

治胸中痞鞭痰飲一切實邪及氣衝咽不得息者用
此吐之

瓜蒂

一分
熬黃

赤小豆

一分

右二味各別搗篩為散已合治之取一錢匕以香
豉一合熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓
服之不吐者少少加服得快吐乃止

註

胸中者清陽之府諸邪入胸皆阻陽氣不得宣達

以致胸滿痞鞭熱氣上衝燥渴心煩噎噎欲吐脈
數促者熱鬱結也胸滿痞鞭氣上衝咽喉不得息
手足寒冷欲吐不能吐脈遲緊者寒鬱結也凡胸
中寒熱與氣與飲鬱結為病諒非汗下之法所能
治必得酸苦湧瀉之品因而越之上焦得通陽氣
得復痞鞭可消胸中可和也瓜蒂極苦赤豆味酸
相須相益能除胸胃中實邪為吐劑中第一品也
而佐香豉粥汁合服者藉穀氣以保胃氣也服之

不吐少少加服得快吐而即止者恐傷胃中元氣
也此方奏功之捷勝於汗下所以三法鼎立今人
不知岐伯仲景之精義置之不用可勝惜哉

小陷胸湯

治心下痞按之則痛脈浮滑者

黃連一兩

半夏半升

栝蒌實

一個大者

右三味以水六升先煮栝蒌實取三升去滓內諸藥煮取二升分溫三服

集註

程知曰此熱結未深者在心下不似大結胸之高在心上按之痛比手不可近為輕脈之浮滑又緩

於沉緊但痰飲素盛挾熱邪而內結所以脈見浮滑也以半夏之辛散之黃連之苦瀉之栝蒌之苦潤滌之皆所以除熱散結於胸中也先煮栝蒌分溫三服皆以緩治上之法

程應旂曰黃連滌熱半夏導飲栝蒌潤燥合之以開結氣亦名曰陷胸者攻雖不峻而一皆直瀉其胸裏之實邪亦從此奪矣

大陷胸湯丸

主治傷寒發熱不發汗而反下之表熱乘虛入於胸中與不得為汗之水氣結而不散令心下至少腹鞭滿而痛不可近其人身無大熱但頭汗出或潮熱燥渴脈沉緊者如水腫腸澼初起形氣俱實者亦可用

大黃 六兩

芒消

苦葶藶子

杏仁 各半升
去皮

甘遂 一錢
為末

右五味以水先煮大黃杏蒺藜去滓內芒消煮一二沸內甘遂末溫服得快利止後服如未劇者加白蜜二合作丸如彈子大水煮一丸服過宿乃下如不下更服

集註

柯琴曰胸中者宗氣之所出故名氣海氣為陽故屬太陽之部氣為水母氣清則水精四布氣熱則水濁而壅結矣水結於胸則津液不下無以潤腸胃故大便必燥不下輸膀胱故水道不通大黃芒

消善滌腸胃之熱實此病在胸中而亦用以為君者熱淫於內當治以苦寒且以潤陽明之燥是實則瀉子之法補膀胱之寒亦制之以其所畏也任甘遂之苦辛所以直攻其水結然水結因於氣結必佐杏仁之苦溫以開其水中之氣氣行而水自利矣水結又因於氣熱必佐葶藶之大寒以清其氣分之熱源清而流自潔矣若胸中水結而未及中焦者當小其制而復以白蜜之甘以緩之使留

戀於胸中過宿乃下但解胸心之結滯而保腸胃
之無傷是又以攻劑為和劑也是方為利水攻積
之劑故治水腫痢疾之初起者甚捷然必視其人
壯實可以一戰成功如平昔素虛弱與病久而不
任攻伐者當念虛虛之戒矣

三物白散方

治傷寒寒實結胸無熱證者及胸膈寒實痰水內結等證

桔梗 三分

貝母 三分

巴豆

一分去皮熬
黑研如泥

右杵二味為末內巴豆於臼中杵之以白飲合服
強人一錢羸者減之病在膈上必吐在膈下必利
不利進熱粥一盃利過不止進冷粥一盃

註是方治寒實痰水結胸極峻之藥也君以巴豆極
辛極烈攻寒逐水斬關奪門所到之處無不破也
佐以貝母開胸之結使以桔梗為之舟楫載巴豆
搜逐胸邪膈上者必吐膈下者必利使其邪悉盡
無餘矣然惟知任毒以攻邪不量強羸鮮能善其
後也故羸者減之不利進熱粥利過進冷粥蓋巴
豆性熱得熱則行得冷則止不用水而用粥者藉
穀氣以保胃也

大黃黃連瀉心湯

治傷寒表解心下痞按之不軟其脈關上浮者

大黃 二兩

黃連 一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服

註

痞鞭虛邪而用大黃黃連能不起後人之疑耶仲景使人疑處正是妙處蓋因後人未嘗細玩不得其法皆煎而服之大悖其旨矣觀乎用氣薄之麻

沸湯漬大黃黃連須臾去滓僅得其無形之氣不
重其有形之味是取其氣味俱薄不大瀉下雖曰
攻痞而攻之之妙義無窮也

附子瀉心湯

治傷寒表解心下痞惡寒汗出者

大黃 二兩

黃連 一兩

黃芩 一兩

附子 一枚炮去皮別煮汁

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓
內附子汁分溫再服

註

心下鞭痛結胸也鞭而不痛心下痞也惡寒而復
汗出非表不解乃表陽虛也故以大黃黃連黃芩

瀉痞之熱附子溫表之陽合內外而治之其妙在
以麻沸湯漬三黃須臾絞去滓內別煮附子汁義
在瀉痞之意輕扶陽之意重也

甘草瀉心湯

治傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化
腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安醫見心
下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃
中虛客氣上逆故使鞭也

甘草

四兩

黃芩

三兩

黃連

一兩

乾薑

三兩

半夏

半升

大棗

十二枚擘

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

註

母論傷寒中風表未解總不可下醫反下之因而成痞其人下利日數十行水穀不化腹中雷鳴者悞下胃中空虛也心下痞鞭而滿乾嘔心煩不得安者乘虛客邪上逆也醫見心下痞鞭謂下之不盡又復下之其痞益甚但此非結熱之痞亦非寒結之痞乃乘胃空虛客氣上逆陽陷陰凝之痞也

方以甘草命名者取和緩之意用甘草大棗之甘
溫補中緩急治痞之益甚半夏之辛破客逆之上
從芩連瀉陽陷之痞熱乾薑散陰凝之痞寒緩急
破逆瀉痞寒熱備乎其治矣

生薑瀉心湯

治傷寒汗出解後胃中不和心下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

甘草

炙二兩

人參

三兩

乾薑

一兩

半夏

洗半升

黃芩

三兩

黃連

一兩

生薑

切四兩

大棗

擘十二枚

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫

服一升日三服

註

傷寒汗出之後餘邪轉屬陽明心下痞滿鞭痛不大便者此其人胃素燥熱因而成實攻之可也今其人平素胃虛兼脇下有水氣即不誤下餘熱乘虛入裏結成痞鞭不痛胃虛不能消化水穀則乾噫食臭也胃中寒熱不和則腹中雷鳴下利也名生薑瀉心湯者其義重在散水氣之痞也生薑半夏散脇下之水氣人參大棗補中州之土虛乾薑

甘草以溫裏寒黃芩黃連以瀉痞熱備乎虛水寒熱之治胃中不和下利之痞未有不愈者也

半夏瀉心湯

治傷寒五六日嘔而發熱柴胡證具而以他藥下之
但滿不痛心下痞者

半夏

半升洗

黃芩

三兩

乾薑

三兩

人參

三兩

黃連

一兩

甘草

三兩炙

大棗

十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫

服一升日三服

集註

王又原曰傷寒五六日柴胡證具而以他藥下之
成痞即用小柴胡湯以乾薑易生薑以黃連易柴
胡彼以和表裏此以徹上下而必推半夏為君者
痞從嘔得來半夏之辛以破結而止嘔也

旋覆代赭石湯

治汗吐下解之後心下痞鞭噫氣不除

旋覆花

三兩

人參

二兩

代赭石

一兩

半夏

半升洗

生薑

五兩切

甘草

三兩炙

大棗

十二枚擘

右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

集註

羅謙輔曰汗吐下解後邪雖去而胃氣已虧矣胃

氣既虧三焦因之失職清無所歸而不升濁無所
納而不降是以邪氣留滯伏飲為逆故心下痞鞭
噫氣不除方中以人參甘草養正補虛薑棗和脾
養胃所以安定中州者至矣更以代赭石之重使
之斂浮鎮逆旋覆花之辛用以宣氣滌飲佐人參
以歸氣於下佐半夏以蠲飲於上濁降痞鞭可消
清升噫氣自除觀仲景治少陰水氣上凌用真武

湯鎮之治下焦滑脫不守用赤石脂禹餘糧固之
此胃虛氣失升降復用此法理之則胸中轉否為
泰其為歸元固下之法各極其妙如此

麻黃連軀赤小豆湯

治傷寒表不解瘀熱在裏發黃者

麻黃 二兩

赤小豆 一升

杏仁

四十枚
去皮尖

生薑

一兩
切

大棗

十二枚
擘

甘草

一兩
炙

生梓白皮 一升

連軀 二兩

以上八味以潦水一斗先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升分溫三服半日則盡

註

濕熱發黃無表裏證熱盛者清之小便不利者利之裏實者下之表實者汗之皆無非為病求去路也用麻黃湯以開其表使黃從外而散去桂枝者避其濕熱也佐薑棗者和其營衛也加連軺梓皮以瀉其熱赤小豆以利其濕同成表實發黃之效也連軺即連翹根無梓皮以茵陳代之成無已曰煎以潦水者取其味薄不助濕熱也

梔子蘖皮湯

治傷寒身黃發熱無表裏證者

梔子

十五枚
擘

甘草 一兩

黃蘖 一兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分溫再服

註傷寒身黃發熱者若有無汗之表以麻黃連軀赤

小豆湯汗之若有成實之裏以茵陳蒿湯下之今
外無可汗表證內無可下裏證惟有黃熱宜以梔

子蘖皮湯清之可也此方之甘草當是茵陳傳寫之誤也

茵陳蒿湯

陽明病發熱但頭汗出身無汗小便不利渴飲水漿此為發熱在裏身必發黃腹微滿者本方主之

茵陳蒿

六兩

梔子

十四枚
擘

大黃

二兩

右三味以水二斗先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分溫三服小便當利如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

集註

柯琴曰太陽陽明俱有發黃證但頭汗出而身無

汗則熱不外越小便不利則熱不下泄故瘀熱在裏然裏有不同肌肉是太陽之裏當汗而發之故用麻黃連翹赤小豆湯為涼散法心胸是太陽陽明之裏當寒以勝之用梔子蘗皮湯乃清火法腸胃是陽明之裏當瀉之於內故立本方是逐穢法茵陳凜北方之氣經冬不凋傲霜凌雪偏受大寒之氣故能除熱邪留結率梔子以通水源大黃以


調胃實令一身內外瘀熱悉從小便而出腹滿自
減腸胃無傷乃合引而竭之之法此陽明利水之
聖劑也又曰仲景治陽明渴飲有四法本太陽轉
屬者五苓散微發汗以散水氣大煩燥渴小便自
利者白虎加參清火而生津脈浮發熱小便不利
者豬苓湯滋陰而利水小便不利腹滿者茵陳蒿
湯以泄滿令黃從小便出病情治法胸有成竹矣
每思仲景利小便必用氣化之品通大便必用承

氣之品故小便不利者必加茯苓甚者兼用豬苓
因二苓為氣化之品而小便由於氣化也茲小便
不利不用二苓者何本論云陽明病汗出多而渴
者不可與豬苓湯以汗多胃中燥豬苓湯復利小
便故也斯知陽明病汗出多而渴者不可用則汗
不出而渴者津液先虛更不可用明矣此以推陳
致新之茵陳佐以屈曲下行之梔子不用枳朴以
承氣與芒消之峻利則大黃但可以潤胃燥而大

便之不遽行可知故必一宿而腹始減黃從小便
去而不由大腸去仲景立法神竒匪夷所思耳



御纂醫宗金鑑卷三十二



總校官庶吉士臣張能照
校對官庶吉士臣翟槐
謄錄監生臣李華文